
GARRA EC

CÁPSULAS

Harpagophytum procumbens DC

Família: Pedaliaceae.

Parte da planta utilizada: raízes.

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

APRESENTAÇÕES

Cartucho com frasco plástico branco opaco contendo 50 cápsulas de 500 mg.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula gelatinosa dura contém:

500 mg de extrato seco das raízes de *Harpagophytum procumbens*.

Equivalente a 8 mg de harpagosídeo.

Excipiente: Amido.

Quantidade: 50 cápsulas.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado como analgésico e antiinflamatório, destinado ao tratamento de enfermidades reumáticas (grupo de doenças que afeta articulações, músculos e esqueleto, caracterizado por dor e restrição do movimento).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

GARRA EC possui ação antiinflamatória e analgésica, efeito atribuído aos componentes presentes em sua formulação conhecidos como glucosídeos iridóides, destacando-se dentre eles o harpagosídeo.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula devem evitar o uso do produto. Não deve ser utilizado em gestantes (devido a provável atividade ocitotóxica), pacientes com úlcera gástrica e duodenal, cólon irritável e obstrução das vias biliares.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos de idade.

Este medicamento é contraindicado para gestantes.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESSE MEDICAMENTO?

Proteger da luz, calor e umidade.

Conservar este medicamento em temperatura ambiente (15 a 30°C).

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: VIDE EMBALAGEM.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento em sua embalagem original.

As cápsulas de GARRA EC (*Harpagophytum procumbens*) são de gelatina dura, transparentes, contendo pó de coloração bege em seu interior.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir 1 a 2 cápsulas, 3 (três) vezes ao dia.

Não deve ser ultrapassado o limite máximo de 9 cápsulas ao dia.

As cápsulas devem ser ingeridas inteiras e sem mastigar com quantidade suficiente de água para que sejam deglutidas.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em casos de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reação incomum (ocorre em 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): Podem ocorrer leves e ocasionais desconfortos gastrintestinais (como diarreias, náuseas, vômitos e dores abdominais) em indivíduos sensíveis.

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações alérgicas e um ligeiro efeito laxativo no início do tratamento podendo cessar espontaneamente.

Pode ocorrer dores de cabeça, tontura e perda de apetite. A revisão da literatura não revela a frequência destas reações.

Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não foram relatados efeitos tóxicos com administração de altas dosagens.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

MS: 1.1678.0015

Farmacêutico Responsável: Aldo Cândido Dadalt
CRF-PR: 4787

As Ervas Curam Indústria Farmacêutica Ltda
Rua Eunice Weaver, 231, Campo Comprido
Curitiba - PR - CEP: 81220-080
CNPJ: 79.634.572/0001-82
Indústria Brasileira
SAC 0800 643 3949

Venda sob prescrição médica.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 15/12/2015.

