

Em caso de uso de grande quantidade deste produto, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou folheto informativo, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

MS: 1.1678.0021

Farmacêutico Responsável: Aldo Cândido Dadalt - CRF-PR: 4787

Fabricado por: As Ervas Curam Indústria Farmacêutica Ltda - Rua Eunice Weaver, 273, Campo Comprido, Curitiba, PR, CEP: 81220-080 - CNPJ: 79.634.572/0001-82 - **Indústria Brasileira.**

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

Este folheto informativo foi aprovado pela Anvisa em 17/08/2020.



01/2024

ARNICA DO MATO EC TINTURA

Arnica brasileira (*Solidago microglossa* DC.)

PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO

Nomenclatura popular: Arnica brasileira, Arnica silvestre.

Nomenclatura botânica oficial: *Solidago microglossa* DC.

Família: Asteraceae.

Parte da planta utilizada: Partes aéreas.

Produto notificado com base no uso tradicional, não sendo recomendado seu uso por período prolongado.

APRESENTAÇÃO

Tintura: extrato hidroalcoólico 0,2 mL/mL - cartucho contendo frasco de vidro âmbar com 100 mL e 1 copo dosador.

USO ORAL/ EXTERNO

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada mL da tintura contém:

0,2 mL de extrato hidroalcoólico das partes aéreas de *Solidago microglossa*.

0,8 mL de veículo (excipientes).

Equivalente a 1,5 mg de quercetina-3-rhamnosídica.

Excipientes: Álcool etílico e água purificada.

Volume: 100 mL.

Este produto contém álcool no teor de 65 %.

1. PARA QUE ESTE PRODUTO É INDICADO?

Uso oral: Este produto é usado tradicionalmente como anti-inflamatório. Uso externo: Este produto é usado para contusões, dores musculares e hematomas.

2. COMO ESTE PRODUTO FUNCIONA?

ARNICA DO MATO EC possui atividade anti-inflamatória. Atua inibindo a liberação de importantes mediadores causadores do processo inflamatório.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE PRODUTO?

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula devem evitar o uso do produto.

A forma farmacêutica tintura, por conter álcool em sua composição, não deve ser usada por pacientes que estão deixando de tomar bebidas alcoólicas, por aqueles que apresentam sensibilidade ao álcool e portadores de doenças crônicas (diabetes e comprometimento hepático).

Este produto é contraindicado para menores de 12 anos de idade.

Este produto é contraindicado para o uso por gestantes e lactantes.

Mulheres grávidas ou amamentando não devem utilizar este produto, já que não há estudos que possam garantir a segurança nessas situações.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE PRODUTO?

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e procurar orientação de um profissional de saúde.

Não administrar doses maiores do que as recomendadas.

Não há casos relatados que o uso deste produto interfira na capacidade de dirigir e operar máquinas.

Não há casos relatados que o uso deste produto interaja com outros produtos, como plantas, medicamentos e alimentos.

Caso os sintomas persistam ou piorem, ou apareçam reações indesejadas não descritas na embalagem ou no folheto informativo, interrompa seu uso e procure orientação de profissional de saúde.

Se você utiliza medicamentos de uso contínuo, busque orientação de profissional de saúde antes de utilizar este produto.

Este produto não deve ser utilizado por período superior ao indicado, ou continuamente, a não ser por orientação de profissionais de saúde.

Informe ao seu profissional de saúde todas as plantas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando. Interações podem ocorrer entre produtos e plantas medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais quando administradas ao mesmo tempo.

Este produto contém álcool no teor de 65 %.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESSE PRODUTO?

Conservar o produto em sua embalagem original, protegendo da luz, calor e umidade.

Conservar este medicamento em temperatura ambiente (15 a 30°C).

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use o produto com prazo de validade vencido.

Para sua segurança, guarde o produto em sua embalagem original.

A tintura de ARNICA DO MATO EC é um líquido de coloração marrom e sabor levemente amargo.

Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Este produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE PRODUTO?

USO ORAL: Ingerir 5 ml da tintura, diluídos em aproximadamente meio copo de água, 3 vezes ao dia, antes das principais refeições.

USO EXTERNO: Aplicar a tintura no local da lesão, com algodão, fazendo uma leve fricção.

A duração do tratamento deve ser condizente com a duração dos sintomas, devendo ser utilizado, no máximo, durante sete dias.

Os produtos tradicionais fitoterápicos não devem ser administrados pelas vias injetável e oftálmica.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE PRODUTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em casos de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE PRODUTO PODE ME CAUSAR?

O uso externo pode ocasionar um avermelhamento e irritação em peles sensíveis, por conter álcool.

O uso interno pode levar ao aumento da atividade cardíaca.

A frequência de ocorrência dos efeitos indesejáveis não é conhecida.

Informe ao seu profissional de saúde o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do produto. Informe também a empresa através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – Notivisa, disponível em www.anvisa.gov.br, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE PRODUTO?

Em altas doses, pode apresentar efeitos tóxicos, podendo ocasionar vômitos.